

# ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА,

принимающего ривароксабан  
2,5 мг (Ксарелто®)\* в комбинации  
с ацетилсалициловой кислотой (АСК)  
по показанию

**«Профилактика инсульта,  
инфаркта миокарда и смерти  
вследствие сердечно-сосудистых  
причин, а также профилактика  
острой ишемии конечностей и  
общей смертности у пациентов  
с ишемической болезнью  
сердца (ИБС) или заболеванием  
периферических артерий (ЗПА)»**

\* Только по назначению врача.

Материал подготовлен исключительно для пациентов, принимающих ривароксабан (Ксарелто®) 2,5 мг и ацетилсалициловую кислоту 75–100 мг по рекомендации врача.

Материал подготовлен в рамках мер по минимизации рисков и не является рекламным.

Я принимаю Ксарелто® (ривароксабан) 2,5 мг х 2 раза в сутки в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в дозе 75-100 мг в сутки

ФИО пациента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИО врача \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Название учреждения, телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Что такое заболевания периферических артерий?

---

**Заболевания периферических артерий (ЗПА)** – группа заболеваний, характеризующихся поражением периферического артериального русла, которое приводит к дефициту кислорода и питательных веществ в соответствующих органах.

Так поражение артерий нижних конечностей может проявляться болями в ногах при ходьбе или трофическими нарушениями (язвами), а поражение сонных артерий может повышать риск развития инсульта даже без каких-либо предшествующих симптомов. Наиболее частой причиной развития ЗПА является атеросклероз.

## Чем опасен атеросклероз периферических артерий?

---

**Атеросклероз** – это заболевание, характеризующееся отложением жировых включений (бляшек) в стенках артерий, которые постепенно сужают их просвет. Чем меньше просвет артерии – тем меньше крови, богатой кислородом и питательными веществами, поступает к органам. В органах и тканях, получающих мало крови, снижаются возможности функционирования и заживления после повреждений. После минимальных травм ткани плохо восстанавливаются и могут возникнуть незаживающие язвы. В запущенных случаях это может привести к гангрене.

Важной и опасной особенностью атеросклеротического процесса яв-

ляется риск разрыва бляшки, который приводит к тромбозу артерии. Последствием такого тромбоза в сонной артерии может стать инсульт, а в артериях нижней конечности – развитие острой или критической ишемии, которые могут привести к потере конечности.

## Профилактика образования тромбов

---

Лечащий врач назначил Вам лекарственный препарат для профилактики образования тромбов. Этот препарат будет снижать способность крови образовывать сгустки (тромбы) при разрывах атеросклеротических бляшек, что позволит уменьшить риск возникновения инсульта и острой ишемии конечности.



**При применении  
анти тромботических препаратов  
следует строго соблюдать  
рекомендации врача**

## Что необходимо знать о Ксарелто® (ривароксабане)?

---

**Ксарелто® (ривароксабан)** – препарат из группы прямых пероральных антикоагулянтов, назначаемых для снижения свертываемости крови и уменьшения риска образования тромбов. Назначение и продолжительность антикоагулянтной терапии ривароксабаном определяется лечащим врачом.

- ◆ Важно придерживаться установленного режима дозирования и не пропускать прием очередной дозы Ксарелто® (ривароксабана).
- ◆ Решение о прекращении приема Ксарелто® (ривароксабана) принимается исключительно Вашим лечащим врачом.

- ◆ Пожалуйста, сообщайте Вашему лечащему врачу обо всех других принимаемых Вами лекарствах, особенно если препараты влияют на гемостаз (НПВП\*, антиагреганты или другие антитромботические средства).
- ◆ Терапия ривароксабаном (Ксарелто®) должна рассматриваться как долговременное лечение, проводящееся до тех пор, пока польза от лечения превышает риск возможных осложнений.
- ◆ Обязательно сообщайте лечащему врачу о приеме ривароксабана (Ксарелто®) перед любыми хирургическими операциями и инвазивными процедурами (стоматологические и эндоскопические процедуры, пункции, биопсии и проч.).

\* НПВП – нестероидный противовоспалительный препарат.



- ◆ Не прекращайте прием ривароксабана без консультации с Вашим лечащим врачом. Прекращение приема препарата ривароксабан (Ксарелто®) может способствовать повышению риска развития инсульта, инфаркта миокарда и смерти вследствие сердечно-сосудистых причин.

## Когда необходимо обратиться к врачу?

---

Если вы принимаете антикоагулянты, такие как Ксарелто® (ривароксабан), очень важно знать о возможных побочных эффектах.

**Кровотечение** – наиболее часто встречающийся побочный эффект. В случае отмены Ксарелто® (ривароксабана) по причине кровотечения не возобновляйте прием самостоятельно без консультации с лечащим врачом.

Необходимо обратиться к врачу при наличии любых симптомов кровотечения, например:

- Кровоподтеки, появляющиеся без причины или при небольших травмах или увеличивающиеся в размерах, носовые кровотечения, обильные кровотечения из десен, кровотечения при порезах, которые не останавливаются в течение более длительного времени, чем обычно;
- Более обильные, чем обычно, менструации, межменструальные кровотечения или кровянистые выделения из влагалища в период менопаузы;
- Розовая или коричневая моча, кал с примесью крови или черный стул;
- Кровохарканье (выделение крови или сгустков крови при кашле), рвота с кровью или рвота, похожая на «кофейную гущу»;
- Необъяснимая отечность, нарушение подвижности или боль в суставах;
- Необъяснимая головная боль, головокружение и слабость.

## Как принимать Ксарелто® (ривароксабан)?

---

Принимайте Ксарелто® (ривароксабан) 2,5 мг внутрь по одной таблетке два раза в день независимо от приема пищи в комбинации с суточной дозой ацетилсалициловой кислоты 75–100 мг в соответствии с рекомендациями врача.

При необходимости, таблетка Ксарелто® (ривароксабан) может быть измельчена и смешана с водой или жидким питанием непосредственно перед приемом.

Если пропущен прием очередной дозы, то необходимо принять Ксарелто® (ривароксабан) в обычной дозе в следующий, запланированный в соответствии с рекомендациями, прием.

## Важная информация

---

Я принимаю Ксарелто® (ривароксабан) 2,5 мг х 2 раза в сутки в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в дозе 75-100 мг в сутки

Другие лекарственные препараты:

---

---

---

---

---

Информация для лечащего врача:

---

---

---

---

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Если Вы хотите сообщить о нежелательной реакции, возникшей при применении Ксарелто® (ривароксабан), пожалуйста, передайте эту информацию своему лечащему врачу, в уполномоченный орган Российской Федерации или в АО "БАЙЕР": +7 495 231 1200 (с 8:00 до 19:00 по московскому времени в будние дни)

АО «БАЙЕР»  
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.  
Тел.: +7 (495) 231 12 00.  
[www.pharma.bayer.ru](http://www.pharma.bayer.ru)

PP-XAR-RU-0304-1;  
MA-M\_RIV-RU-0165-1