

Что необходимо знать о препарате Ксарелто®?

- ◆ Ксарелто® разжижает кровь, предотвращая тем самым образование тромбов.
- ◆ Ксарелто® необходимо принимать точно в соответствии с предписаниями врача. Для обеспечения оптимальной защиты от образования тромбов прием препарата не следует пропускать.
- ◆ Не следует прекращать прием препарата Ксарелто® без предварительных рекомендаций врача, поскольку может повыситься риск образования тромбов.
- ◆ Перед началом приема препарата Ксарелто® следует сообщить врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые Вы или Ваш ребенок принимаете в настоящее время, принимали ранее или планируете принимать.
- ◆ Перед любым хирургическим вмешательством или инвазивной процедурой следует сообщить врачу о приеме Вами или Вашим ребенком препарата Ксарелто®.

Когда необходимо обратиться к врачу?

При приеме антикоагулянтов, таких как Ксарелто®, важно знать о возможных нежелательных реакциях. Кровотечение является наиболее часто встречающейся нежелательной реакцией. Если имеется риск кровотечения, то Вам не следует принимать или давать Вашему ребенку препарат Ксарелто® без предварительной консультации с врачом.

Следует незамедлительно обратиться к врачу при наличии у Вас или Вашего ребенка любых симптомов кровотечения, например:

- ◆ Боль
- ◆ Отек или дискомфорт
- ◆ Головная боль, головокружение или слабость
- ◆ Кровоподтеки, носовые кровотечения, кровоточивость десен, кровотечения при порезах, которые не останавливаются дольше, чем обычно
- ◆ Более обильные, чем обычно, менструации или вагинальные кровотечения

- ◆ Моча розового или коричневого цвета, кал с примесью крови или черного цвета
- ◆ Кашель или рвота с кровью или рвота «кофейной гущей»

Как давать ребенку препарат Ксарелто®? Как принимать препарат Ксарелто®?

- ◆ Для обеспечения оптимальной защиты препарат Ксарелто® 1 мг/мл необходимо давать/принимать во время кормления (грудным молоком или смесью) или во время еды.
- ◆ Также суспензия для приема внутрь может быть введена через назогастральную трубку или желудочный зонд.



Ксарелто®
РИВАРОКСАБАН

Памятка пациента



Ксарелто® (ривароксабан)
1 мг/мл гранулы
для приготовления
суспензии для приема
внутри для детей

- ◆ Сохраните данную памятку
- ◆ Перед началом лечения следует предоставить данную памятку каждому врачу

Пожалуйста, посмотрите обучающие видео, демонстрирующие, как готовить и применять суспензию для приема внутри для детей



Менее 4 кг



4 кг и более

<https://pharma.bayer.ru/products/xarelto>

Пациент, который принимает препарат Ксарелто® (ривароксабан) в рамках антикоагуляционной терапии

ФИО

Другие лекарственные препараты/
заболевания

Адрес

Дата рождения

Вес

Материал подготовлен исключительно для пациентов, принимающих ривароксабан (Ксарелто®) гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь для детей по рекомендации врача. Материал подготовлен в рамках мер по минимизации рисков и не является рекламным материалом. Материал одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении, возникшем на фоне применения Ксарелто® (ривароксабан), пожалуйста, передайте информацию своему лечащему врачу, в регуляторные органы или в АО «БАЙЕР»: +7 495 231 1200 (в рабочее время). АО «БАЙЕР» 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2. Тел.: +7 (495) 231 12 00. MA-M_RIV-RU-0494-1

В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о следующем:

ФИО врача

Телефон врача

Печать врача

Сообщите также о следующем:

ФИО

Телефон

Родственные отношения

Информация для врача:

- ◆ Не следует использовать значения МНО, поскольку они не являются надежным показателем антикоагулянтной активности препарата Ксарелто®