

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ФИРИАЛТА® (ФИНЕРЕНОН) У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК (С АЛЬБУМИНУРИЕЙ) НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА¹ с целью замедления темпов прогрессирования ХБП и снижения риска сердечно-сосудистых катастроф

1. Начало лечения	2. Лабораторный контроль	3. Корректировка дозы		
<p>10 мг 1 р/д если:</p> <p>Калий в сыворотке крови $\leq 4,8$ ммоль/л или $>4,8 - 5,0$ ммоль/л*</p> <p>+ рСКФ ≥ 25 до <60 мл/мин/1,73 м²</p>	<p>Проверьте уровень калия сыворотки крови и рСКФ через 4 недели после:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Начала приема препарата Фириалта® ◆ Возобновления приема препарата Фириалта® ◆ Увеличения дозы препарата Фириалта® <p>и регулярно в последующем</p>	<p>Уровень калия в сыворотке крови (ммоль/л)</p>	<p>Текущая доза: 10 мг 1 р/д</p>	<p>Текущая доза: 20 мг 1 р/д</p>
<p>20 мг 1 р/д если:</p>		<p>$\leq 4,8$</p>	<p>Увеличьте дозу до 20 мг 1 р/д (Сохраните дозу 10 мг 1 р/д если рСКФ снизилась более, чем на >30 % по сравнению с предыдущим измерением)</p>	<p>Сохраняйте дозу</p>
<p>Калий в сыворотке крови $\leq 4,8$ ммоль/л или $>4,8 - 5,0$ ммоль/л*</p> <p>+ рСКФ ≥ 60 мл/мин/1,73 м²</p>		<p>$>4,8 - 5,5$</p>	<p>Сохраняйте дозу</p>	
	<p>$>5,5$</p>	<p>Прекратите прием препарата Фириалта®. Возобновите прием с дозы 10 мг 1 р/д когда концентрация калия в сыворотке крови станет $\leq 5,0$ ммоль/л. Оцените уровень калия сыворотки крови через 4 недели.</p>		

- Лечение препаратом Фириалта® может быть продолжено до достижения стадии терминальной почечной недостаточности (рСКФ <15 мл/мин/1,73 м²).
- У пациентов с рСКФ <25 мл/мин/1,73 м² не следует начинать лечение препаратом Фириалта®, поскольку клинические данные ограничены.

- Осуществляйте регулярный контроль уровня калия в сыворотке крови и корректируйте дозу препарата Фириалта® при необходимости.
- Пациенты могут продолжить прием других препаратов, таких как сахароснижающие и антигипертензивные средства, на фоне лечения препаратом Фириалта®.

* Если концентрация калия в сыворотке крови $>4,8 - 5,0$ ммоль/л, то можно рассмотреть вопрос о начале лечения препаратом Фириалта® с дополнительным мониторингом калия в сыворотке крови в течение первых 4 недель в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и концентрации калия в сыворотке крови.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ФИРИАЛТА®

- Если пациент не способен проглотить таблетку целиком, таблетку препарата Фириалта® можно измельчить и смешать с водой или мягкой пищей, например, яблочным пюре, непосредственно перед пероральным применением. Таблетки не следует принимать с грейпфрутом или грейпфрутовым соком.
- Коррекция дозы в зависимости от массы тела не требуется.
- Коррекция дозы у пожилых пациентов не требуется.
- Препарат Фириалта® не следует назначать одновременно с:
 - калийсберегающими диуретиками (например, амилоридом, триамтереном);
 - другими антагонистами минералокортикоидных рецепторов (например, эплереноном, спиронолактоном, канреноном).
- Одновременный прием препарата Фириалта® с итраконазолом, кларитромицином и другими мощными ингибиторами CYP3A4 (например, кетоконазолом, ритонавиром, нелфинавиром, кобицистатом,

телитромицином или нефазодоном) противопоказан, поскольку ожидается заметное увеличение воздействия финеренона.

- Не следует принимать препарат Фириалта® совместно с рифампицином и другими мощными индукторами CYP3A4 (например, карбамазепином, фенитоином, фенобарбиталом, препаратами зверобоя) или эфавирензом и другими умеренными индукторами CYP3A4. Ожидается, что эти индукторы CYP3A4 заметно снижают концентрацию финеренона в плазме крови и приводят к снижению терапевтического эффекта.
- Препарат Фириалта® не следует применять во время беременности, если только клиническое состояние женщины не требует лечения финереноном. Если женщина забеременела вовремя приема финеренона, ее следует проинформировать о потенциальных рисках для плода.
- Безопасность и эффективность препарата Фириалта® при применении у детей и подростков в возрасте до 18 лет не установлена. Данные отсутствуют.



➤ **Ищите дополнительную информацию о ХБП при СД2 и современных возможностях терапии на сайте**
<https://savekidney.esculap-med.ru/post/lechenie-HBP-pri-SD2>



рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации.

Литература:

1. Общая характеристика лекарственного препарата Фириалта®. Номер регистрационного удостоверения ЛП-№(002030)-(PF-RU).

➤ Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с общей характеристикой лекарственного препарата Фириалта®.

АО «БАЙЕР» 107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
тел.: +7 (495) 231-12-00

Материал создан АО БАЙЕР 04.2024 для специалистов здравоохранения.
Номер одобрения: PP-FI-RU-0006-1.
Дата одобрения: 06.05.2024.