



# ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА,

принимающего ривароксабан 2,5 мг  
(Ксарелто®)\* по показанию

**«Профилактика смерти  
вследствие сердечно-сосудистых  
причин и инфаркта миокарда  
у пациентов после **острого  
коронарного синдрома\*\***»**

\* Только по назначению врача.

\*\*С полной формулировкой показания можно ознакомиться  
в инструкции по применению препарата.

Материал подготовлен исключительно для пациентов, принимающих ривароксабан (Ксарелто®) 2,5 мг по рекомендации врача.

Материал подготовлен в рамках мер по минимизации рисков и не является рекламным.

Материал одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

ФИО пациента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИО врача \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Название учреждения, телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Что такое инфаркт миокарда?

**Острый инфаркт миокарда (ИМ)** – это грозное осложнение ишемической болезни сердца, при котором наблюдается прекращение кровоснабжения сердечной мышцы. В результате этого происходит гибель участка миокарда, так как клетки сердечной мышцы не получают кислорода и питательных веществ. В некоторых тяжелых случаях это может привести к немедленной смерти. В других ситуациях в миокарде формируется рубец, который в дальнейшем может стать причиной осложнений.

У пациентов, перенесших инфаркт, в дальнейшем наблюдается высокий риск повторного инфаркта или других сердечно-сосудистых осложнений.

## Почему это важно знать?

**Тромб – это плотный сгусток крови, который образуется в кровеносных сосудах.**

В норме процесс свертывания крови защищает организм от кровотечения в случае повреждения кровеносных сосудов. Иногда процесс свертывания крови приобретает патологический характер и приводит к образованию тромбов. Опасность тромба заключается в его способности нарушать или полностью блокировать кровоток в сосудах.

Тромбоз – тяжелое и грозное по своим последствиям состояние. Но у многих пациентов можно предупредить развитие тяжелых осложнений и повторного тромбоза, если проводить своевременное и адекватное лечение.

## Профилактика образования тромбов

Для вторичной профилактики смерти вследствие сердечно-сосудистых причин, инфаркта миокарда и тромбоза стента, в острой фазе после ИМ назначают лечение антитромбоцитарными средствами, а также рекомендуют применение антикоагулянтов. Скорее всего, лечащий врач назначит Вам лекарственные препараты для профилактики образования тромбов в сосудах сердца. Применение антикоагулянтов будет снижать способность крови образовывать сгустки (тромбы), что позволит уменьшить риск повторного возникновения ИМ или смерти вследствие других сердечно-сосудистых причин.

**При применении антикоагулянтов для профилактики тромбообразования следует соблюдать рекомендации врача**

## Что необходимо знать о Ксарелто® (ривароксабане)?

---

**Ксарелто® (ривароксабан)** – препарат из группы новых пероральных антикоагулянтов, назначаемых для снижения свертываемости крови и предотвращения образования тромбов. После острого коронарного синдрома рекомендуемая доза составляет одну таблетку Ксарелто® 2,5 мг 2 раза в сутки. Также необходимо принимать суточную дозу ацетилсалициловой кислоты или суточную дозу ацетилсалициловой кислоты в сочетании с суточной дозой клопидогрела или стандартной суточной дозой тиклопидина. Назначение и продолжительность антикоагулянтной терапии ривароксабаном определяется лечащим врачом.

Рекомендуемая продолжительность лечения составляет 12 месяцев. Лечение может быть продлено до 24 месяцев для

отдельных пациентов. Проводимое лечение должно регулярно оцениваться с точки зрения соблюдения баланса между риском развития ишемических событий и риском кровотечения.

Важно придерживаться установленного режима дозирования и не пропускать прием очередной дозы Ксарелто® (ривароксабана). Решение о прекращении приема Ксарелто® (ривароксабана) принимается исключительно Вашим лечащим врачом.

Пожалуйста, сообщайте Вашему лечащему врачу обо всех других принимаемых Вами лекарствах. Обязательно сообщайте лечащему врачу о приеме Ксарелто® (ривароксабана) перед любыми хирургическими операциями и инвазивными процедурами (стоматологические и эндоскопические процедуры, пункции, биопсии и проч.).

## Когда необходимо обратиться к врачу?

При приеме Ксарелто® (ривароксабан) в сочетании с антиагрегантной терапией (ацетилсалициловая кислота 75–100 мг в сутки, клопидогрел 75 мг в сутки или тиклопидин) наиболее часто встречающимся побочным эффектом является кровотечение.

При возникновении кровотечения необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу. Следующий прием препарата следует отложить или при необходимости вообще отменить лечение данным препаратом.

В случае отмены терапии по причине кровотечения не возобновляйте прием препаратов самостоятельно без консультации с лечащим врачом.



## Необходимо обратиться к врачу при наличии любых симптомов кровотечения, например:

- Кровоподтеки, появляющиеся без причины или при небольших травмах или увеличивающиеся в размерах, носовые кровотечения, обильные кровотечения из десен, кровотечения при порезах, которые не останавливаются в течение более длительного времени, чем обычно;
- Более обильные, чем обычно, менструации, межменструальные кровотечения или кровянистые выделения из влагалища в период менопаузы;
- Розовая или коричневая моча, кал с примесью крови или черный стул;
- Кровохарканье (выделение крови или сгустков крови при кашле), рвота с кровью или рвота, похожая на «кофейную гущу»;
- Необъяснимая отечность, нарушение подвижности или боль в суставах;
- Необъяснимая головная боль, головокружение и слабость.

## Как принимать Ксарелто® (ривароксабан)?

---

Принимайте Ксарелто® (ривароксабан) 2,5 мг внутрь по одной таблетке 2 раза в сутки, в сочетании с рекомендованной антиагрегантной терапией независимо от приема пищи, в одно и то же время в соответствии с рекомендациями врача.

При необходимости, таблетка Ксарелто® (ривароксабана) 2,5 мг может быть измельчена и смешана с водой или жидким питанием непосредственно перед приемом.

Если пропущен прием очередной дозы, то необходимо продолжить прием в обычной дозе, то есть в следующий запланированный прием в соответствии с рекомендованным режимом.

Не следует удваивать принимаемую дозу для компенсации пропущенной ранее.

## Важная информация

---

Я принимаю Ксарелто® (ривароксабан) в дозе 2,5 мг x 2 раза в сутки в сочетании с антиагрегантной терапией.

Длительность антикоагулянтной терапии:

---

Другие лекарственные препараты:

---

---

---

---

Информация для лечащего врача:

---

---

---

---

Если Вы хотите сообщить о нежелательной реакции, возникшей при применении Ксарелто® (ривароксабан), пожалуйста, передайте эту информацию своему лечащему врачу, в уполномоченный орган Российской Федерации или в АО «БАЙЕР»: **+7 495 231 12 00** (с 8:00 до 19:00 по московскому времени в будние дни)

АО «БАЙЕР»  
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.  
Тел.: +7 (495) 231 12 00.  
[www.pharma.bayer.ru](http://www.pharma.bayer.ru)