

Дата регистрации показания 30.01.2019

#### Новое показание «блокбастера» Ксарелто®

*Вауер зарегистрировал новое показание\* для применения ривароксабана (Ксарелто®) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и заболеванием периферических артерий (ЗПА) на территории России. **На сегодняшний день Ксарелто® – единственный прямой оральным антикоагулянт (ПОАК), одобренный для профилактики сердечно-сосудистых событий у пациентов со стабильным течением ИБС или ЗПА.***

От заболеваний сердечно-сосудистой системы ежегодно умирают 15 млн. человек во всем мире. **Россия**, по данным ВОЗ, относится к странам с одним из **самых высоких уровней смертности** от сердечно-сосудистых заболеваний. Так в нашей стране, от болезней системы кровообращения в 2016 году умерло более **900 000 человек**. В 2017 году в России было зарегистрировано **более 4,5 млн. больных с хронической ИБС**. А от заболеваний периферических артерий во всем мире страдают **202 млн.** человек. При этом совершенно очевидно, что больные в нашей стране характеризуются худшим прогнозом в сравнении с остальным миром.

Профилактика сосудистых событий имеет особое значение для пациентов с ИБС или ЗПА, поскольку они подвержены риску развития тяжелых последствий атеросклероза – системного прогрессирующего заболевания. Несмотря на стандартную антитромбоцитарную терапию, рекомендованную современными руководствами, риск сосудистых событий остается высоким – **почти 10 пациентов из 100 переносят инфаркт миокарда, инсульт или сердечно-сосудистую смерть в течение двух лет.**

\*

Решение о регистрации нового показания основано на данных исследования III фазы COMPASS, которое продемонстрировало, что «сосудистая» доза ривароксабана (2,5 мг 2 р/д) в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в дозе 100 мг 1 р/сут снижает суммарный риск значимых сердечно-сосудистых событий – **инсульта, сердечно-сосудистой смерти и инфаркта миокарда на 24%** по сравнению с монотерапией ацетилсалициловой кислотой в дозе 100 мг 1 р/сут у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) или симптоматическим заболеванием периферических артерий (ЗПА) с высоким риском ишемических осложнений.

С регистрацией нового показания область использования Ксарелто® расширяется. Опыт практического применения накоплен более чем у 45 млн пациентов по 8 показаниям в мире.

PP-M\_RIV-RU-0016-1